

FEMIHEALTH s.r.o.

Kollárova 664/1

Litovel 784 01

IČO: 29389666

Informovaný souhlas se zavedením nitroděložního tělíska

Jméno:

RČ:.....

žádám o zavedení nitroděložního tělíska

1) nehormonální, typ :

2) s hormonem gestagenem-Mirena, Kyleena, Jaydess (nehodící se vymažte/škrtněte)

byla jsem informována, jak nitroděložní tělísko funguje, ohledně jeho antikoncepční účinnosti (žádná -antikoncepce není 100% spolehlivá) i o možných nežádoucích účincích: 1. Prodloužení a zesílení menstruačního krvácení u nehormonálních tělísek 2. U tělíska Mirena, Kyleena a Jaydess může dojít k nepravidelnému špinění či krvácení, které obvykle mizí do 3-6 měsíců, pak může cca z 20% nastat úplné vymizení menstruačního krvácení 3. Dočasná bolest podbříšku těsně po zavedení tělíska. 4. Není-li kanál děložního hrdla dostatečně volný, může velmi vzácně při obtížnějším zavedení dojít i k poranění dělohy-proražení stěny děložní. 5. Zavedením nitroděložního tělíska může vzniknout děložní zánět.

Dále jsem byla informována o možných dlouhodobých komplikacích spojených se zavedením tělíska: Zejména u nehormonálních tělísek může vznikat zánět v děloze, často spojený s bolestí břicha, větší než při menses, s krvácením mimo cyklus, horečkou, který, není-li včas léčen, může mít za následek neprůchodnost vejcovodů. Ve vzácných případech může tělísko vypadnout z dělohy ven. Tělíska mohou vzácně vycestovat do dutiny břišní, kdy je pak nutné je laparoskopicky vyjmout. I při zavedeném nitroděložním tělísku může vzniknout těhotenství nebo mimoděložní těhotenství. Byly mi podrobně zodpovězeny všechny mé dotazy.

Dne.....

podpis.....